

LIVACOX®-Q

Kanatlılar için drtl attene edilmiř canlı koksidiozis ařısı

ENDİKASYONLAR

Ařı, damızlık evcil kanatlılarda (*Gallus domesticus*) koksidiozise karřı hayat boyu immuniteyi stimle eder. İmmunite, ařılamadan 10-14 gn sonra geliřir.

TANIM

Beyazımsı sspansiyon.

KOMPOZİSYON

1 mL LIVACOX® Q, kloramin'in %1 w/v'lik sulu zltisinde *Eimeria tenella*, *E. acervulina* ve *E. maxima'nın* attenue edilmiř suřunun her birinden 30,000 – 50,000 oosit ve *E. necatrix*'ten 10,000 oosit ierir.

UYGULAMA

LIVACOX® Q, 1 – 10 gnlk civcivlerde oral olarak verilmelidir. Őiře iyice alkalanır ve ierięi ařaęıda belirtilen Őekilde yeterli miktarda ime suyu ile dile edilir. Her bir civcivin btn ařı dozunu aldıęından emin olunmalıdır, susuzluęu uyarmak iin ařı uygulanmadan 2 saat nce civcivlere su verilmeli ve ime tankına baęlı otomatik suluk sistemiyle verilebilir.

DOZAJ

1 mL (=100 doz) of LIVACOX® Q, 1 litre ime suyunda karřtırılır, rneęin, 10-mL Őiře ierięi 10 L su ile dile edilerek 1,000 tavuk ařılanır, 50-mL Őiře ierięi 50 L su ile dile edilerek 5,000 tavuk ařılanır.

UYARILAR

1. LIVA-COX®
2. Btn yetiřtirme periyodu sırasında, yemde antikoksidiyal ilalar veya furazolidan kullanmayınız.
3. LIVA-COX® kullanmayınız.
4. LIVACOX® Q sadece soęuk ime suyu ile dile edilir.
5. Tm hayvanların tam ařı dozunu alabilmeleri iin yeterli miktarda suluk saęlanmalıdır.
6. Teřhis laboratuvarına ařılanmiř tavukların gnderilmiř olan karkasları iin, LIVACOX® bilgisi verilmelidir; dięer trl ařıdan kaynaklanan koksidia oositlerinin varlıęı yanlıř koksidiozis teřhisine neden olabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

LIVACOX® Q'nun tavuk yetiřtiricilięinde kullanılan dięer ařı programlarıyla bilinen olumsuz bir etkileřimi yoktur.

YAN ETKİLER

Bilinen bir yan etkisi yoktur.

YASAL ARINMA SRESİ

Yoktur.

RAF MR

retim tarihinden itibaren 9 aydır.

SAKLAMA KOŐULLARI: +2 °C ve +8 °C'de ocukların ulařamayacaęı yerde tutulur. Dondurmayınız!

AMBALAJ ŐEKLİ

10 mL (=1,000 doz) veya 50 mL (=5,000 doz) aŐı, vidalı kapaklı polietilen ŐiŐelerde sunulmuŐtur. Her iki boyuttaki ŐiŐelerden 10 ŐiŐe bir karton kutuda sunulmuŐtur.

KULLANILMAMIŐ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŐULLARI

ŐiŐeler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.

SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.

İthalatçı Firma: GüneŐli AŐı İlaç- Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü- İstanbul

Üretici Firma: Biopharm- Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs a.s.,
CZ-254 49 Jílové near Prague,
Czech Republic.